

第二版影響指標表(画像・数値)

分野	指標 ¹	全国	県別	計算期間	備考
気候	年平均気温	基準期間からの差		2031～2050 2081～2100	
	年降水量	基準期間からの比			
水資源	河川流量 ²	基準期間からの比	流域別		
	クロロフィルa（年平均）	数値(μg/L)	ダム湖別		数値データのみの提供
	クロロフィルa（年最高）				数値データのみの提供
沿岸・防災	斜面崩壊発生確率	絶対値(%)	絶対値(%)		
	砂浜消失率	消失率(%)	なし		数値データのみの提供
生態系	ハイマツ潜在生育域	基準期間からの比	メッシュ数	2081～2100	
	シラビソ潜在生育域	基準期間からの比			
	ブナ潜在生育域*	基準期間からの比			
	ブナ潜在生育域**（A）	基準期間からの比			
	アカガシ潜在生育域	基準期間からの比	メッシュ数		
農業	コメ収量（A1,A2）	基準期間からの比		2031～2050 2081～2100	
	ウンシュウミカン栽培適地	全国の比率 ³	基準期間からの比		
	タンカン作付適地		県内の比率 ³		
健康	熱ストレス超過死亡者数（A）	基準期間からの比 ⁴			数値データのみの提供
	熱中症搬送者数	基準期間からの比			数値データのみの提供
	ヒトスジシマカ分布域	全国の比率	県内の比率		

¹適応策を検討している指標は(A)と表示, ²2091～2100を対象, ³全国/県内における作付適地の割合,

⁴2010年人口を基準値, *潜在区域すべてを対象, **保護区内の潜在生育域のみを対象